



Natuurdoeltype

DOTTERBLOEM-GRASLAND VAN BEEKDALEN

Beschrijving

Alle natuurgebieden en parken in Eindhoven hebben een zogenaamd 'natuurdoeltype'. Een natuurdoeltype geeft aan wat voor soort natuur op een plek kan ontstaan. Om dit te bepalen hebben ecologen gekeken naar het bodemtype (zand, leem of juist veen), de waterhuishouding (nat of droog) en de aanwezige natuur in de natuurgebieden in de omgeving. Vaak maken de gebieden waar een natuurdoeltype voor bepaald is onderdeel uit van het groene netwerk dat door Eindhoven loopt, maar er zijn ook geïsoleerde natuurgebiedjes te vinden. In het vak hiernaast staat een toelichting bij het natuurdoeltype dat van toepassing is op het gebied waar u op hebt geklikt.

Wat kunt u ermee doen?

- Als uw perceel een natuurdoeltype heeft, zoek dan contact met een stadsecoloog van de gemeente, zij kunnen aangeven wat de kansen en mogelijkheden zijn om hier iets mee te doen.
- Als uw perceel grenst aan een bepaald natuurdoeltype kunt u kijken of u op uw perceel iets kunt doen om dit natuurdoeltype te versterken. Grenst uw perceel bijvoorbeeld aan 'bos', overweeg dan u perceel aantrekkelijk te maken voor de Egel, zodat deze voldoende voedsel kan vinden en niet enkel afhankelijk is van het bos.

Dotterbloem-grasland van beekdalen

Dotterbloemgrasland komt voor op (matig) natte (GHG: 20 +mv tot 20 -mv, GLG: 40 tot 80 -mv), zwak zure tot neutrale, (matig) voedselrijke bodems (humusrijk en lemig zand, leem, klei en veen).

Het graslandtype wordt doorgaans gevoed door matig zuur tot basisch grondwater. Vroeger werden ze ook overstroomd met schoon beekwater, rivierwater of water afkomstig van een bevoeiingssysteem. Dergelijke overstromingen komen momenteel nauwelijks meer voor. Een associatie van het Dotterbloem grasland, het Veldrushooiland, is afhankelijk van lokaal, zacht en matig zuur grondwater. Meestal treft men het Veldrushooiland aan op de flanken van beekdalen. Kenmerkend voor het Dotterbloem-grasland type hooiland zijn Gewone Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Brede orchis, Tweerijige zegge, Moeraszegge, Moerasstrepzaad en Bosbies.

Opvallend in het hooilandtype is het plaatselijk voorkomen van bosplanten, zoals Slanke sleutelbloem, Muskuskruid en vroeger ook Zwartblauwe rapunzel. Dotterbloemhooilanden kwamen eertijds algemeen voor in de beekdalen en polders. Momenteel is het graslandtype zeer zeldzaam. Het beheer bestaat uit eenmaal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel.



EINDHOVEN