

Natuurdoeltype

WILGEN- STRUWEEL

Beschrijving

Alle natuurgebieden en parken in Eindhoven hebben een zogenaamd 'natuurdoeltype'. Een natuurdoeltype geeft aan wat voor soort natuur op een plek kan ontstaan. Om dit te bepalen hebben ecologen gekeken naar het bodemtype (zand, leem of juist veen), de waterhuishouding (nat of droog) en de aanwezige natuur in de natuurgebieden in de omgeving. Vaak maken de gebieden waar een natuurdoeltype voor bepaald is onderdeel uit van het groene netwerk dat door Eindhoven loopt, maar er zijn ook geïsoleerde natuurgebiedjes te vinden. In het vak hiernaast staat een toelichting bij het natuurdoeltype dat van toepassing is op het gebied waar u op hebt geklikt.

Wat kunt u ermee doen?

- Als uw perceel een natuurdoeltype heeft, zoek dan contact met een stadsecoloog van de gemeente, zij kunnen aangeven wat de kansen en mogelijkheden zijn om hier iets mee te doen.
- Als uw perceel grenst aan een bepaald natuurdoeltype kunt u kijken of u op uw perceel iets kunt doen om dit natuurdoeltype te versterken. Grenst uw perceel bijvoorbeeld aan 'bos', overweeg dan u perceel aantrekkelijk te maken voor de Egel, zodat deze voldoende voedsel kan vinden en niet enkel afhankelijk is van het bos.

Wilgenstruweel

Het subnatuurdoeltype 'Wilgenstruweel' bestaat uit broekbos waarin Geoorde wilg of Grauwe wilg domineren. Het komt voor op (zeer) natte (GHG: 30 +mv tot 0 mv, GLG: 0 tot 40 -mv). Het type met Geoorde wilg is aanwezig op zure, matig voedselrijke veengrond. Naast Geoorde wilg groeien er Vuilboom, Zachte berk en Pijpestro. Momenteel is het type zeldzaam in Noord-Brabant. Het type met Grauwe wilg is aanwezig op zwak zure tot neutrale, (matig) voedselrijke zand-, leem en veengronden. Naast Grauwe wilg treft men er Bitterzoet, Gele lis, Wataardbei en andere moerasplanten. Het type is tamelijk algemeen in Noord-Brabant. Het beheer bestaat uit niets doen.

Het subnatuurdoeltype 'Gagelstruweel' is een zeer soortenarme struweelvegetatie waarin Wilde gagel aspectbepalend is. Daarnaast komen in het struweeltype soms soorten voor als Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Veenpluis, Beenbreek en veenmossen. Gagelstruweel komt voor op (tamelijk) natte (GHG: 0 tot 40 -mv, GLG: 40 tot 80 -mv), matig tot zwak zure, voedsel- en kalkarme, zand- en lemige zandbodems. Doorgaans worden de struwelen gevoed door lokaal kwelwater. Gagelstruweel is thans relatief zeldzaam in Noord-Brabant. Het beheer bestaat uit niets doen.



EINDHOVEN